สถานการณ์โรคไข้เลือดออก (เฝ้าระวังโรค) จังหวัดยโสธร

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2558 จังหวัดยโสธร ได้รับรายงานผู้ป่วย(เฝ้าระวัง) โรคไข้เลือดออกสะสม จำนวน 1237 ราย อัตราป่วย 229.39 ต่อประชากรแสนคน มีรายงานผู้เสียชีวิต 2 ราย อัตราผู้ป่วยตายเท่ากับ ร้อยละ 0.16 พบผู้ป่วยเพศชาย 587 คน เพศหญิง 650 ราย

กลุ่มอายุที่พบสูงสุด คือ กลุ่มอายุ 15-24 ปี จำนวน 403 ราย รองลงมา คือ กลุ่มอายุ 10-14 ปี และ 5-9 ปี จำนวน 342 และ 183 ราย ตามลำดับ อาชีพที่มีผู้ป่วยสูงสุด คือ นักเรียน จำนวน 739 ราย รองลงมา คือ อาชีพเกษตร อาชีพในปกครอง และอาชีพรับจ้าง จำนวน 159, 123 และ 120 ราย ตามลำดับ และพบผู้ป่วยสูงสุดในเดือนสิงหาคม จำนวน 410 ราย

อำเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ อำเภอมหาชนะชัย อัตราป่วย 392.10 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ อำเภอค้อวัง และอำเภอเลิงนกทา อัตราป่วย 339.39 และ 332.73 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ

ลำดับที่	อำเภอ	จำนวน	อัตราป่วย	ผู้ป่วยตาย	อัตราป่วยตาย(%)
1	มหาชนะชัย	227	392.10	0	0.00
2	ค้อวัง	88	339.39	0	0.00
3	เลิงนกทา	315	332.73	1	0.32
4	ไทยเจริญ	77	255.03	0	0.00
5	คำเขื่อนแก้ว	134	197.02	0	0.00
6	เมือง	243	186.62	1	0.41
7	ทรายมูล	50	161.16	0	0.00
8	ป่าติ้ว	43	122.76	0	0.00
9	กุดชุม	60	90.50	0	0.00
รวม		1,237	229.39	2	0.16

One Page of DHF (ที่มา ; สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร)

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกระดับประเทศ (ผู้ป่วยยืนยัน)

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 - 22 ธันวาคม 2558 พบผู้ป่วย 138,794 ราย อัตราป่วย 217.28 ต่อประชากรแสนคน เสียชีวิต 139 ราย อัตราป่วยตาย ร้อยละ 0.10

เขตสุขภาพที่ 10 (22 ธันวาคม 2558)

จังหวัด	ประชากร	จำนวนผู้ป่วย	ผู้ป่วยตาย	อัตราป่วย/แสน	อัตราป่วยตาย	อันดับประเทศ
อุบลราชธานี	1844669	4822	6	261.40	0.12	21
ศรีสะเกษ	1465213	3320	2	226.59	0.06	27
ยโสธร	540211	1087	2	201.22	0.18	30
อำนาจเจริญ	375380	595	1	158.51	0.17	38
มุกดาหาร	346016	349	0	100.86	0.00	61
รวม	4571489	10173	11	222.53	0.11	

มาตรการป้องกันควบคุมโรค

1.เน้นมาตรการ 6ป (ปิด เปลี่ยน ปล่อย ปรับปรุง ป้องกันไม่ให้ยุงกัด ปฏิบัติ) ในสถานที่ 6s คือ (โรงเรือน โรงเรียน โรงพยาบาล โรงงาน โรงทาน โรงแรม-รีสอร์ท)

2.กรณีมีผู้ป่วยให้เร่งกำจัดลูกน้ำยุงลายในบ้านผู้ป่วยและรอบบ้านผู้ป่วยในรัศมีอย่างน้อย 100 เมตร รวมทั้งที่โรงเรียน หรือที่ทำงาน และสำรวจลูกน้ำยุงลายทั้งชุมชนทุกวัน *โดยค่า HI=0 เป็นเวลาอย่างน้อย 1 เดือน และไม่มีผู้ป่วยติดต่อกันเกิน 28 วัน*

3.การพ่นสารเคมีควรดำเนินการอย่างน้อย 2 ครั้ง ห่างกัน 7 วัน และประเมินผลการพ่นสารเคมีหลังดำเนินงาน 1 วัน

4.ค้นหาผู้ป่วย/สงสัยที่มีไข้สูงทุกวัน **มีไข้สูงติดต่อกัน 3 วัน ส่ง รพ.ทันที**

5.ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร โดย นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม ออกแคมเปญรณรงค์ **“ชาวเมืองบั้งไฟไล่ล่าลูกน้ำยุงลาย ตอนบ่าย 4 โมง”** และกำหนดให้เป็นมาตรการที่สำคัญเพื่อควบคุมป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่จังหวัดยโสธร โดยขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน และหน่วยงานต่างๆ ให้ค้นหาและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายทุกวัน ให้ถือเป็นภารกิจของครัวเรือน